

QU'EN EST-IL DES VISITEURS ?



- ✓ Votre famille et les visiteurs doivent respecter les mesures affichées sur la porte.
- ✓ Le matériel est à leur disposition près de l'entrée de la chambre.
- ✓ Ils ne peuvent pas s'asseoir sur le lit.
- ✓ Il est impératif que les visiteurs se désinfectent les mains avant et après leur visite.



VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?

Le personnel soignant est à votre disposition pour y répondre.



HOSTMOVE-INFP-DeplinfosMRSA (V1-06/2026)

NOUS CONTACTER

Move ASBL | Réseau hospitalier-régional
bd Patience et Beaujonc 9 | B-4000 Liège
+32 (0)4 355 77 50 | info@move.be

Les informations contenues dans cette brochure sont mentionnées à titre strictement indicatif et sont toujours susceptibles de modifications.

move

Votre réseau de santé
Dein Gesundheitsnetzwerk



LE MRSA

Methicillin-Resistant
Staphylococcus Aureus adulte

www.move.eu

CH3
GROUPE SANTÉ

KLINIK
ST. JOSEF
ST. VITH

ST. NIKOLAUS
HOSPITAL
EUPEN

Qu'est-ce que le MRSA ?



Le MRSA (Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus) est un germe commun que l'on peut trouver sur la peau et dans les narines. Ce staphylocoque résiste aux antibiotiques les plus fréquemment utilisés.

COMMENT LE MRSA SE TRANSMET-IL ?

Le MRSA se transmet essentiellement par les mains. Une personne peut donc contaminer facilement les autres et les objets qu'elle touche. Une hygiène stricte des mains de la part de tous les professionnels de la santé, visiteurs et patients est dès lors indispensable.

QUE FAIT-ON À L'HÔPITAL POUR ARRÊTER LA PROPAGATION DU MRSA ?

Les collaborateurs de l'hôpital prennent des précautions particulières avec les patients porteurs de MRSA afin d'empêcher sa propagation.

Des mesures d'hygiène simples mais efficaces

- ✓ Les soignants pratiquent une hygiène des mains avant et après un contact avec les patients. Leurs mains sont lavées à l'eau savonneuse ou désinfectées à l'aide d'une solution hydro-alcoolique.
- ✓ Les patients porteurs de MRSA peuvent être installés dans une chambre en isolement.
- ✓ La décolonisation du MRSA d'une durée de 5 jours est prescrite par le médecin.



CONDITIONS GÉNÉRALES



Avant de commencer la décolonisation

- ✓ Remplacer le matériel à usage unique (brosse à dents, rasoir jetable, déodorant roller, etc.).
- ✓ Nettoyer la brosse à cheveux, le peigne ou autre matériel (rasoir électrique, etc.) avec du savon antiseptique.

Pendant la décolonisation

- ✓ **Toilette au savon antiseptique** (privilégier la douche) 1x/jour avec du linge propre (gants et et essuies) chaque jour.
Lavez-vous le corps, de haut en bas, en savonnant généreusement*
 - les cheveux, sans oublier de les rincer
 - le visage en insistant bien derrière les oreilles
 - le cou, les bras, le tronc en insistant bien au niveau des aisselles, du nombril et des plis sous la poitrine
 - les jambes en insistant sur le pli de l'aîne et l'arrière des genoux
 - les pieds en insistant bien entre les orteils
 - la région génitale
 - terminez par la région anale et le pli inter-fessier.Rincez-vous abondamment de haut en bas et séchez toutes les zones du corps avec un essuie propre.
* Avec l'iso-Betadine®, lavez-vous jusqu'à ce que la couleur brune disparaisse pour devenir blanche.

- ✓ **Bain de bouche**
Spray, chlorhexidine bain de bouche ou iso-Betadine® Buccale spray / bain de bouche
 - rincez-vous la bouche avec la solution buccale après le brossage des dents
 - gargarisez si possible.
- ✓ **Entretien des prothèses dentaires**
 - brossez votre prothèse avec votre dentifrice habituel, puis rincez
 - trempez-les ensuite dans une solution d'iso-Betadine® Buccale pendant 20 minutes (n'utilisez pas de produits à base de chlorhexidine), puis rincez.
- ✓ Porter des vêtements propres chaque jour. Le linge doit être lavé à part et à 60°. Changer entièrement la literie chaque jour.

Et après la décolonisation...

Deux jours après la fin de la décolonisation, des frottis de contrôle seront effectués. En cas d'échec de décolonisation, la procédure sera appliquée une seconde fois.